

Orientações para Medicamentos de uso contínuo

Nós somos do SMA - Serviços Médicos de Anestesia, uma organização médica que presta Serviços de anestesia e tratamento de dor nos principais hospitais da cidade de São Paulo desde 1942. Preparamos esta lista de medicamentos recomendados para uso e suspensão pré-operatória.

É importante que você converse com o seu médico e siga suas orientações quanto ao uso ou suspensão de medicamentos antes da cirurgia. Comunique sobre todos os medicamentos em uso, incluindo vitaminas e medicamentos naturais.

Suspender por 15 dias

- **TICLOPIDINA®** (Ex: TICLID®)

Suspender por 10 dias

- **DULAGLUTIDA®** (Ex: TRULICITY®)
- **SEMAGLUTIDA®** (Ex: OZEMPIC®)

Suspender por 8 dias

- **PRASUGREL®** (Ex: EFFIENT®)
- **TICAGRELOR®** (Ex: BRILINTA®)
- **CLOPIDOGREL®** (Ex: PLAVIX®, ISCOVER®)

Suspender por 7 dias

- Suplementos alimentares e fitoterápicos: Alho e Ginseng

Suspender por 6-7 dias

- **VARFARINA®** (Ex: MAREVAN®, COUMADIN®)
- **FEMPROCUMONA®** (Ex: MARCUMAR®)

Suspender por 5 dias

- Suplementos alimentares e fitoterápicos: Erva de são joão

Suspender por 3 dias

- **DAPAGLIFLOZINA®** (Ex: FORXIGA®)
- **EMPAGLIFLOZINA®** (Ex: JARDIANCE®)
- **LIRAGLUTIDA®** (Ex: SAXENDA®, VICTOZA®, XULTOPHY®)
- **SEMAGLUTIDA** (Ex: Rybelsus®)
- Suplementos alimentares e fitoterápicos: Gingko biloba

Suspender por 2 dias

- **ABCIXIMAB®** (Ex: REOPRO®)
- **APIXABANA®** (Ex: ELIQUIS®)
- **CILOSTAZOL®** (Ex: VASOGARD®)
- **DABIGATRANA®** (Ex: PRADAXA®)
- **DIPIRIDAMOL®** (Ex: PERSANTIN®)
- **FONDAPARINUX®** (Ex: ARIXTRA®)
- **RIVAROXABANA®** (Ex: XARELTO®)
- **SAVAYSA®** (Ex: ENDOXABAN®)

Suspender por 1 dia

- **ENOXAPARINA®** (Ex: CLEXANE®)
- **NADROPARINA®** (Ex: FRAXIPARINA®)

Medicações de uso contínuo que devem ser mantidas até o dia da cirurgia:

- **Betabloqueadores:** esmolol, betaxalol, metoprolol, atenolol
- **AAS,** exceto se for realizar neurocirurgia, cirurgia oftálmica ou cirurgia urológica endoscópica
- **Anti-arrítmicos:** digoxina, amfepromona
- **Alfa bloqueadores:** prazosin, doxazosin
- **Bloqueadores de canais de cálcio:** anlodipino
- **Anti-hipertensivos de ação central:** clonidine, alfa metildopa

Medicações de uso crônico que devem ser suspensas no dia da cirurgia:

- **Inibidores da ECA:** captopril, enalapril, lisinopril
- **Bloqueadores da angiotensina II:** losartana, candesartana
- **Inibidores da fosfodiesterase:** sildenafil
- **Nitratos:** isossorbida
- **Estatinas:** atorvastatina, rosuvastatina
- **Anticonvulsivantes:** Tegretol, Tegretard, Rivotril
- **Antipsicóticos:** haloperidol, flufenazina
- **Lítio**
- **Ansiolíticos:** Paroxetina, Pregabalina, Sertralina, Quetiapina
- **Baclofeno:** Lioresal, Baclon
- **Medicamentos tópicos oftalmológicos**
- **Corticosteroides:** dexametasona
- **Imunossupressores:** Imussuprex, Prednisolona

Fale conosco

 (11) 3373-8800

 www.sma.com.br

 sac.anestesia@sma.com.br